

IZOCONONAZOL ROMINKKO 600 MG, ovule

Prospect – informații pentru utilizator

IZOCONONAZOL ROMINKKO 600 MG, ovule nitrat de izoconazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

În acest prospect găsiți:

1. Ce este **IZOCONONAZOL ROMINKKO** și pentru ce se utilizează
2. Înainte să luați **IZOCONONAZOL ROMINKKO**
3. Cum să utilizați **IZOCONONAZOL ROMINKKO**
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează **IZOCONONAZOL ROMINKKO**
6. Informații suplimentare

1. CE ESTE IZOCONONAZOL ROMINKKO ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Se utilizează pentru tratamentul local în cazul infecțiilor micotice ale vaginului, inclusiv infecții mixte cu bacterii gram-pozitiv.

2. ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI IZOCONONAZOL ROMINKKO

Nu utilizați IZOCONONAZOL ROMINKKO

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la nitrat de izoconazol sau la oricare dintre celelalte componente ale **IZOCONONAZOL ROMINKKO**.
- în același timp cu diafragmele din latex sau prezervative.

Aveți grija deosebită când utilizați IZOCONONAZOL ROMINKKO

- dacă prezentați o reacție alergică se impune întreruperea tratamentului.

Sfaturi practice:

- toaleta cu un săpun cu pH neutru sau alcalin
- tratamentul trebuie să se asocieze cu igiena riguroasă (purtarea lenjeriei din bumbac, evitarea dușurilor vaginale, evitarea utilizării tamponelor interne pe **perioada** tratamentului) și, în măsura în care este posibil, cu eliminarea factorilor favorizanți.

IZOCONONAZOL ROMINKKO 600 MG, ovule

Prospect – informații pentru utilizator

Pentru tratamentul regiunilor genitale externe sau perianale și pentru tratamentul simultan al partenerului se recomandă administrarea locală de creme conținând antimicotice.

Pentru a evita reinfecțarea, lenjeria personală (prosoape, lenjerie de corp) trebuie schimbată zilnic și fiartă.

Utilizarea altor medicamente:

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Nu utilizați IZOCONONAZOL ROMINKKO împreună cu:

- produse din latex (de exemplu, prezervative, diafragme)
- spermicide vaginale.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

IZOCONONAZOL ROMINKKO poate fi utilizat în timpul sarcinii numai dacă medicul consideră absolut necesar.

În timpul alăptării, IZOCONONAZOL ROMINKKO poate fi utilizat la recomandarea medicului.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

IZOCONONAZOL ROMINKKO nu afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. CUM SĂ UTILIZAȚI IZOCONONAZOL ROMINKKO

Luati întotdeauna **IZOCONONAZOL ROMINKKO** exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este de un ovul în administrare unică, seara la culcare. În cazul micozelor recidivante administrarea se repetă după 3 zile.

IZOCONONAZOL ROMINKKO se introduce în vagin, cât mai profund posibil.

Pentru introducerea ovulului așezați-vă în poziție culcat pe spate, având picioarele depărtate și ușor îndoite.

Nu se recomandă utilizarea ovulelor în timpul perioadei menstruale.

Tratamentul trebuie terminat înainte de începerea menstruației.

Dacă utilizați mai mult decât trebuie din IZOCONONAZOL ROMINKKO

În cazul ingestiei accidentale pot să apară greață, vărsături, amețeli. În aceste situații contactați departamentul de urgență al celui mai apropiat spital.

IZOCONAZOL ROMINKO 600 MG, ovule

Prospect – informații pentru utilizator

Dacă uitați să utilizați IZOCONAZOL ROMINKO

Dacă aveți o micoză recidivantă pentru care medicul v-a recomandat o a doua doză și ați uitat să o administrați, administrați-o cât mai curând posibil. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați IZOCONAZOL ROMINKO

Nu încetați mai devreme tratamentul cu IZOCONAZOL ROMINKO chiar dacă vă simțiți mai bine.

Dacă încetați să utilizați IZOCONAZOL ROMINKO mai devreme decât v-a recomandat medicul, pot apare recidive.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, **IZOCONAZOL ROMINKO** poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Riscul de reacții adverse sistemice este mic (vezi pct. 5.2)

Foarte rar (la mai puțin din 1 din 10000 pacienți) pot să apară reacții alergice generale, în special urticarie și edem Quinke. La nivel local, se pot observa senzații de arsură sau prurit în timpul primelor 24 de ore de la administrare. Dacă aceste simptome sunt severe și persistă trebuie informat medicul.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. CUM SE PĂSTREAZA IZOCONAZOL ROMINKO

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați IZOCONAZOL ROMINKO după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

Ce conține IZOCONAZOL ROMINKO

- Substanța activă este nitratul de izoconazol. Un ovul conține nitrat de izoconazol 600 mg.
- Celelalte componente sunt gliceride de semisinteză.

IZOCONONAZOL ROMINKO 600 MG, ovule

Prospect – informații pentru utilizator
Cum arată IZOCONONAZOL ROMINKO și conținutul ambalajului

Se prezintă sub formă de ovule de formă ovoidă, de culoare albă până la aproape alb-gălbui.
Este disponibil în cutie cu o folie termosudată din PE-PVC a 3 ovule.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

ROMINKO SA
Conect Business Park, et 4
Bd-ul D. Pompei nr.10A, Sector 2, 020337, București, România

Producător

MAGISTRA C&C S.R.L.
Bd-ul Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanța, România

Acest prospect a fost aprobat în Decembrie 2008.